

پروجیسٹرون 25 ملی گرام
محلوں برائے انجیکشن

Lubion®

آپ کے IVF دور کے لوٹیل سپورٹ کے لیے
ایک آبی پروجیسٹرون

زیر جلد خود سے انجیکشن لگانے کا ایک ہدایت نامہ



Caring Innovation

تیاری کی تاریخ: اپریل 2023 UKLU00169

Lubion کا استعمال کیسے کریں؟

قبل اس کے کہ آپ پہلا انجیکشن شروع کریں، اپنے باتھوں کو دھوئیں اور کام کے لیے ایک صاف سترہی سطح تیار کریں جس پر آپ اپنی ساری ضروری چیزیں رکھے سکیں:-



سرنج

انجیکشن کی چھوٹی سونی (اکثر زرد یا خاکستری)

لمبی ڈرانٹنگ اپ سونی (اکثر بری یا گلابی)

مانع بنائے کی شیشی Lubion®

نوکیلی اشیاء کا کوڑے دان

- بڑی ڈرانٹنگ اپ سونی کو سرنج سے مربوط کریں، سونی کے حفاظتی ڈھنکن کو اس کی جگہ پر برقرار رکھتے ہوئے۔



- Lubion® کی شیشی سے پلاسٹک کا حفاظتی کیپ بٹھانی، شیشی کے اوپری حصہ میں ریٹ کی ایک جھلی کو اکسپوز کرتے ہوئے۔
- بڑی والی سونی سے حفاظتی ڈھنکن بٹھانی۔



- شیشی کے اوپری حصہ میں موجود ریٹ کی جھلی میں سونی سے سوراخ کریں، سونی کو آرام سے شیشی کے نچلے حصہ تک دھکیلیں اور دھیرے دھیرے مخلوق کو سرنج میں کنکید کریں۔
- سونی نکال لین اور ہب بقینی بنائے کے لیے پلنجر کو تھوڑا پیچھے کی طرف کھینچیں کہ سونی میں کوئی مانع باقی نہ رہ گیا ہو۔



- سرنج سے ڈرانٹنگ اپ سونی کو الگ کر لین اور اس کو Lubion® کی خالی شیشی کے ساتھ نوکیلی اشیاء کے کوڑے دان میں ضائع کر دیں۔



- انجیکشن کی چھوٹی سونی کو سرنج سے مربوط کریں، سونی کے حفاظتی ڈھنکن کو اس کی جگہ پر برقرار رکھتے ہوئے۔



انجیکشن کی سونی سے سونی کا حفاظتی ڈھنکن بٹا دین اور بوا کے بلیلوں کے لیے سرنج کی تفتیش کریں۔

سرنج کو اس طرح پکڑیں کہ سونی کا سرا اوپر کی طرف ہو اور اپنی انگلی سے سرنج کو بلکا جھٹکا دیں بہاں تک کہ تمام بلیے اور پری سرے پر جمع ہو جائیں۔



سرنج کے پلنجر کو آرام سے دھکلیں بہاں تک کہ تمام بلیے نکل جائیں اور مانع کا ایک قفلہ سونی کے سرے پر ظاہر ہو جائے۔



Lubion زیر جلد انجیکشن کے طور پر پیٹ میں یا ران کے اوپری حصہ میں دیا جاتا ہے۔

پیٹ کے مقام پر انجیکشن دیتے وقت اس بات کی سفارش کی جاتی ہے کہ اس کام کو ناف کے نیچے ایک قوس کے علاقے میں کہیں پر کرنا چاہیے۔

کیون کہ پروٹکٹ روزانہ دیا جاتا ہے انجیکشن کے مقام کو تبدیل کرتے رہنے کی سفارش کی جاتی ہے ناکہ ایک بھی جگہ میں انجیکشن کی تکرار نہ ہو۔



ایک ساتھ مضبوطی سے جلد کو چٹکی میں پکڑ لیں اور 45° تا 90° کے درمیان ایک زاویہ پر سونی داخل کریں۔



چٹکی میں پکڑی ہوئی جلد کو چھوڑنے کے ساتھ ساتھ پلنجر کو آپستہ اور مسلسل دباتے ہوئے پوری دوا داخل کر دیں۔



Lubion کی تیاری اور انجیکشن کے طریقہ کے سلسلہ میں ایک مکمل ویڈیو گانٹیڈ کے لیے QR کوڈ اسکین کریں یا ملاحظہ کریں:
www.ibsapharma.co.uk/products/product/lubion

مجھے پروجیسٹرون کیوں تجویز کی گئی ہے؟

کسی نارمل مابواری کے پلے نصف میں، بیضے جن ساختوں میں بڑے ہوتے ہیں انہیں فولیکل کہا جاتا ہے جو کہ بیضہ کے ارد گرد بارمون کی افزائش کرنے والے خلیوں کی تہوں اور بارمون سے بھرپور مانع کی ایک چھپل سے تیار ہوتے ہیں۔ فولیکل ایسٹروجن نامی ایک بارمون پیدا کرتا ہے جو کہ انڈومیٹریم یا جسم دانی کی پرت میں تکثیر (جمع ہونے) کا باعث ہوتا ہے۔ عام طور پر خواتین کے یہاں ایک غالب فولیکل ہوتا ہے، جو دور کے وسط کے اس پاس پہٹ جاتا ہے جس سے انڈا ریلیز ہوتا ہے۔ اس کو بیضہ ریزی کہا جاتا ہے۔ بیضہ ریزی کے بعد، خالی فولیکل تبدیل ہو کر ایک ساخت ہو جاتا ہے جس سے انڈا کارپس نوٹیم کہا جاتا ہے، جو کہ پروجیسٹرون پیدا کرتا ہے۔

پروجیسٹرون انڈومیٹریم کو تبدیل کرتا ہے تاکہ وہ جنین کو قبول کرنے اور پھر پروان چڑھانے کے لیے سازگار بن جائے۔ پروجیسٹرون انڈومیٹریم کو برقرار رکھتا ہے اور مخصوص مواد کی ریزش کو بینی بناتا ہے جو کہ اس کو ٹوٹے پھوٹے سے محفوظ رکھتا ہے۔ پروجیسٹرون مامونیتی نظام کو متاثر کرتا ہے اور لہذا وہ ابتدائی اور جاری حمل کو باقی رکھنے کے لیے انتہائی ضروری ہے۔^{2.1}

اگر آپ نے ART (اعانتی تو ولیدی ٹیکنالوجی) سے علاج کرایا ہے جیسے انڈیو فریٹالائزشن (IVF)، انтра سائٹوپلازمک اسپرم انجیکشن (ICSI) یا بیضہ کے عطیہ کے بعد تو "لوٹیل سپورٹ" کے لیے اضافی پروجیسٹرون فرایم کرنا معمول کا عمل ہے۔ یہ سپورٹ عام طور پر بیضہ کے کلکشن کے فراہ بعد شروع ہو جاتا ہے اور جب تک جسم اپنے طور پر کافی مقدار میں پروجیسٹرون پیدا نہ کرے اور اس کو اضافی سپورٹ کی ضرورت باقی نہ رہے جاری رہتا ہے۔^{2.2}

حوالہ جات

Shah NM, Lai PF, Imami N, Johnson MR. Progesterone-Related Immune Modulation of Pregnancy and Labor. Front Endocrinol (Lausanne). 2019;10:198. Published 2019 Mar 29. doi:10.3389/fendo.2019.00198

Schumacher A, Costa SD, Zenclussen AC. Endocrine factors modulating immune responses in pregnancy. Front Immunol. 2014 May;5:196.

منفی وقوع

اگر آپ کو کوئی ضممنی اثرات پر جاتے ہیں تو اپنے ڈاکٹر، فارمیسٹ یا نرس سے بات کروں۔ اس میں کوئی بھی ایسے ممکنہ ضممنی اثرات شامل ہیں جو پیکچ کے ورقہ میں مذکور نہیں ہیں۔

آپ ضممنی اثرات کی اطلاع راست طور پر یلو کارڈ اسکمی (Yellow Card Scheme) کے ذریعہ میں مذکور نہیں ہیں۔

ضممنی اثرات کی اطلاع دے کر آپ اسی دوا کے محفوظ ہوتے کے سلسلہ میں

مزید معلومات فرایم کرنے میں مدد کر سکتی ہیں۔

